



Azienda Ulss 12
Veneziana

Procedura Operativa

**PREMEDICAZIONE
CONSIGLIATA PAZIENTI
ALLERGICI**

Dipartimento Diagnostica per Immagini

PO/00003
REV1
03/04/2014

PREMEDICAZIONE CONSIGLIATA IN PAZIENTI ALLERGICI

Alla cortese attenzione del Medico Curante

del/della Sig. /Sig.ra

Il/ la sua Paziente riferisce allergia a sostanze, medicinali o mezzo di contrasto iodato/paramagnetico. Se non è possibile considerare l'effettuazione di un esame diagnostico alternativo sebbene esistano scarse evidenze cliniche sull'efficacia della premedicazione, suggeriamo un trattamento farmacologico preparatorio all'indagine radiologica con uso di mdc. per via endovenosa, allo scopo di ridurre e/o prevenire reazioni allergiche secondo il seguente schema:

METILPREDNISOLONE 32 mg	<u>Una somministrazione in cp per os 12h e una 2h prima dell'esame</u>
CETIRIZINA 10 mg	<u>1 compressa per os 1h prima dell'esame</u>
RANITIDINA 300 mg	<u>1 compressa per os 24h e 12h prima dell'esame</u>

E' inoltre utile consigliare al Paziente un'abbondante idratazione prima e dopo l'esame, per accelerare l'eliminazione del m.d.c. per via renale, soprattutto nei casi di insufficienza renale ed epatica.

In caso di reazioni allergiche tardive dopo l'esame rivolgersi al proprio medico curante; consigliamo il seguente trattamento fino a scomparsa dei sintomi:
Metilprednisolone. 1 cp 16 mg dopo 12h dall'esame.
Cetirizina: 1 cp 10 mg dopo 12h dall'esame.
Ranitidina: 1 cp da 10 mg dopo 12h dall'esame.



Sistema Gestione
Qualità Azienda Ulss 12
Veneziana

File: MD-07

Pagina 2 di 2